

Targeting allotopic material to the mitochondrial compartment: new tools for better understanding mitochondrial physiology and prospect for therapy

Pierre Rustin, Howard Jacobs, André Dietrich, Robert Lightowlers, Ivan Tarassov, Marisol Corral-Debrinski

► To cite this version:

Pierre Rustin, Howard Jacobs, André Dietrich, Robert Lightowlers, Ivan Tarassov, et al.. Targeting allotopic material to the mitochondrial compartment: new tools for better understanding mitochondrial physiology and prospect for therapy. médecine/sciences, EDP Sciences, 2007, 23 (5), pp.519-525. <inserm-00149569>

HAL Id: inserm-00149569

<http://www.hal.inserm.fr/inserm-00149569>

Submitted on 28 May 2007

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

► Les dysfonctions mitochondriales occupent une place désormais incontournable dans de nombreux domaines de la pathologie humaine. Elles sont reconnues maintenant dans un vaste spectre de présentations cliniques : atteintes d'organes, isolées ou en association, cancers ; elles sont aussi la cible importante de nombreux virus, dont celui du SIDA... Primaires ou secondaires, elles participent de plus au vieillissement de l'organisme. Malgré les progrès réalisés sur un plan génétique, beaucoup reste à faire, surtout si l'on considère le dénuement quasi-total dans lequel nous nous trouvons pour combattre ces affections. Les recherches dans **le domaine** de la physiologie et de la pathophysiologie mitochondriales ont une longue histoire en France avec les travaux initiaux de génétiques moléculaires réalisés sur la levure, de bioénergétique du fonctionnement de la chaîne respiratoire, ou encore de recherches en physiologie cellulaire végétale. Ce n'est donc sans doute pas un hasard si quatre équipes françaises, essentiellement issues de ces domaines fondamentaux, souvent en collaborations avec des partenaires européens, se sont attelées au défi que constitue la lutte contre les maladies mitochondriales. Les approches décrites dans cette revue ne représentent à ce stade que des pistes sur un chemin que l'on peut prévoir long et semé d'embûches. Elles sont toutes originales et à ce titre comportent indubitablement une part de risque et d'incertitude, mais elles sont aussi porteuses d'espoir avec à la clé un enjeu important en regard de l'impact de ces maladies. ◀

Les maladies mitochondriales forment un groupe croissant d'affections multifformes aux causes génétiques multiples [1]. Cela ne constitue pas véritablement une surprise, si l'on considère qu'outre les 37 gènes portés par le génome mitochondrial, plus de 1500 gènes nucléaires sont nécessaires

Adresser du matériel allogène dans le compartiment mitochondrial

Un défi pour comprendre la physiologie mitochondriale et une perspective pour la thérapie

Pierre Rustin, Howard T. Jacobs, André Dietrich, Robert N. Lightowlers, Ivan Tarassov, Marisol Corral-Debrinski



au bon fonctionnement mitochondrial (*Figure 1A*). Il est aventureux de chiffrer l'impact de ces maladies. De plus, il semble que le vieillissement des organismes aérobies (et les maladies qui chez l'homme lui sont associées) résulte en grande partie de perturbations des fonctions mitochondriales. On assiste de fait à la naissance d'une véritable *médecine mitochondriale* avec comme socle commun les perturbations de la synthèse d'ATP, de la manipulation de l'oxygène et des intermédiaires carbonés [1].

Pierre Rustin : Inserm U676, Hôpital Robert Debré and Université Paris 7, Faculté de Médecine Denis Diderot, IFR02, 75019 Paris, France, Howard T. Jacobs : Institute of Medical Technology and Tampere University Hospital, FI-33014 University of Tampere, Finland, André Dietrich Institut de Biologie Moléculaire des Plantes du CNRS, Université Louis Pasteur, 12 rue du Général Zimmer, 67084 Strasbourg Cedex, France, Robert N. Lightowlers^a : Mitochondrial Research Group, School of Neurology, Neurology and Psychiatry, Medical School, University of Newcastle upon Tyne, Framlington Place, Newcastle upon Tyne, NH2 4HH, UK, Ivan Tarassov UMR 7156 « Génétique Moléculaire, Génomique, Microbiologie », CNRS and Université Louis Pasteur, 21 rue René Descartes, 67084 Strasbourg, Cedex, France, Marisol Corral-Debrinski Laboratoire de Physiopathologie Cellulaire et Moléculaire de la Rétine, Inserm U592 and Université Pierre et Marie Curie (UPMC-Paris 6), Hôpital St. Antoine, 75571 Paris Cedex 12, France. Pierre.Rustin@rdebre.inserm.fr

Face à ces maladies, les capacités d'interventions thérapeutiques restent quasi inexistantes. En effet, à quelques rares exceptions, l'identification chez une partie des patients des gènes porteurs de mutation n'a malheureusement pas réellement fourni les clés espé-

rées pour combattre ces maladies. Cette situation a conduit de nombreux groupes à travers le monde, en particulier en France, à imaginer des stratégies nouvelles pour tenter d'enrayer ces atteintes. La nou-

veauté des stratégies retenues implique une part de risque évidente et les obstacles avant d'envisager leur mise en œuvre chez l'homme sont encore nombreux. Parmi ces approches nouvelles figure l'idée d'importer dans les mitochondries du matériel exogène, ADN, ARN ou protéines ayant une activité curative (Figure 2). Comme on peut bien l'imaginer, importer chacun de ces types de molécules impose des contraintes propres. Des machineries très élaborées et maintenant bien caractérisées permettent le transport des protéines à travers les membranes mitochondriales (Figure 3) [2]. En revanche, l'import de certains ARN dans les mitochondries humaines et sa signification physiologique ont été longtemps un sujet de controverse et les relations entre cet import et celui des protéines restent incertaines et probablement différentes d'une espèce à l'autre. Finalement, les mécanismes intervenant dans l'import d'ADN dans les mitochondries sont pour l'instant bien mystérieux.

Importer de l'ADN dans les mitochondries

À priori l'idée d'importer de l'ADN dans les mitochondries semble folle, un tel phénomène n'ayant jamais été observé à ce jour *in vivo*. Il existe cependant un échange directionnel reconnu de matériel génétique depuis l'ADN mitochondrial (ADNmt) vers le noyau. Durant l'évolution, une grande partie des gènes initialement portés par l'ADNmt se sont retrouvés dans l'ADN nucléaire, ce transfert s'accompagnant de nombreuses insertions de pseudo-gènes. Ces gènes peuvent ou non, selon les espèces, être présents dans les deux génomes, mitochondrial et nucléaire. Une illustration de ce transfert de certains gènes entre mitochondries et noyau nous est donnée chez les plantes (Figure 1B, C) [3]. Ainsi, dans la famille




Figure 1. Les gènes codant pour les sous-unités des complexes de la chaîne respiratoire. A. La double origine nucléaire et mitochondriale de la centaine de protéines constituant la chaîne respiratoire participe à la complexité génétique des maladies mitochondriales. Un nombre considérable de protéines additionnelles, plus de 1500, sont en réalité nécessaires au bon fonctionnement des mitochondries. Les composants de la chaîne respiratoire synthétisés à partir de l'ADN mitochondrial sont indiqués en vert. B, C. Au cours de l'évolution, une bonne partie des gènes codant pour les constituants de la chaîne respiratoire a migré depuis l'ADN mitochondrial vers l'ADN nucléaire. C'est le cas du gène *Cox2* qui dans la famille des *Papilionacées* est présent à l'état actif dans l'un ou l'autre des génomes. mt, mitochondrial ; nucl., nucléaire.

des Papilionacées¹, le gène *cox2* codant pour une sous-unité du complexe IV (cytochrome oxydase ; *Figure 1A*) de la chaîne respiratoire (CR) va se trouver porté par l'ADNmt et avoir une copie non fonctionnelle dans le

génomé nucléaire. Chez une espèce de plante très voisine, la copie nucléaire est devenue active, alors que dans une troisième espèce, la copie mitochondriale sera absente.




Figure 2. Les différents types de molécules allotopiques possiblement importées dans les mitochondries. De l'ADN nu mis au contact des mitochondries est susceptible d'y être importé par un mécanisme encore inconnu, puis d'y être utilisé pour synthétiser de l'ARN (A). Des ARN de transfert cytosoliques peuvent être importés dans les mitochondries, soit par l'intermédiaire du complexe TOM/TIM normalement responsable de l'import des protéines (B), soit par un système d'import spécifique RIC (RNA import complex) provenant d'un protozoaire (C). Un gène normalement porté par l'ADNmt peut-être recodé selon le code universel et l'ARNm correspondant traduit à la surface des mitochondries pour assurer un import efficace de la protéine synthétisée (D). Une protéine d'intérêt, normalement absente chez l'homme, peut être exprimée dans le but de compléter fonctionnellement un déficit mitochondrial (E). TOM, translocase of the outer membrane; TIM, translocase of the inner membrane.

La séquence des copies retrouvées dans le noyau montre cependant que selon toute probabilité, chez ces plantes, ce n'est pas de l'ADN qui a quitté les mitochondries mais plutôt de l'ARN édité (modification post-transcriptionnelle de certains C en U fréquente dans les mitochondries végétales). L'insertion de l'ARN ainsi exporté des mitochondries dans le génome nucléaire résulterait d'une activité transcriptase inverse. Chez l'homme, un phénomène voisin implique des fragments d'ADNmt appelés NUMTs (nuclear DNA sequences from mitochondrial origin), mais cette fois, comme dans la levure *Saccharomyces cerevisiae*, il semble bien qu'il s'agisse réellement d'ADN inséré lors de la réparation de cassures double brin de l'ADN nucléaire [4]. Une telle translocation d'ADN du cytoplasme vers le noyau pourrait intervenir lors de la désorganisation de la membrane nucléaire intervenant durant les divisions cellulaires ou grâce à un transport actif via les complexes formant les pores nucléaires. L'insertion de ces fragments de gènes mitochondriaux perturberait l'expression de gènes normalement portés par le génome nucléaire. Elle semble se produire en effet de façon préférentielle dans des régions codantes ou régulatrices et pourrait rendre compte de certaines pathologies. Encore chez les plantes et plus spectaculaire, le séquençage du génome d'une crucifère (*Arabidopsis thaliana*) a révélé une insertion de la quasi-totalité du génome mitochondrial (367 kb) dans le chromosome 2 [5]. Inversement, les génomes mitochondriaux des végétaux, dont la taille approche 600 kb, ont acquis des séquences nucléaires, chloroplastiques ou virales, auxquelles s'ajoute un grand nombre de séquences d'origine et de fonction inconnues [6]. Des plasmides mitochondriaux autonomes sont également présents dans beaucoup

¹ Appelées aussi Légumineuses (Légumineuses) ou Fabacées. Du latin papilio « papillon », à cause des ses pétales inégaux ressemblant à l'insecte. On compte dans cette famille aussi bien des arbres et arbustes que des plantes herbacées dont le fruit est une gousse

d'espèces végétales [7]. Le mécanisme à la base de tous ces échanges est inconnu, cependant leur existence laisse à penser qu'un transfert d'ADN à partir de, et vers, les mitochondries est possible. Une expérience de mise en contact d'ADN nu avec des mitochondries isolées a ainsi mon-

tré que des mitochondries intactes extraites de végétaux peuvent importer de l'ADN nu par des voies naturelles [8]. De façon similaire, des mitochondries isolées de foie de rat ou de cellules humaines se sont révélées être com-

pétentes dans l'import d'ADN [9]. L'ADN ainsi importé peut servir de matrice pour re-synthétiser de l'ADN ou pour permettre une transcription en ARN, résultant en un ARN polycistronique pouvant ensuite subir les étapes de maturation.

Bien que le mécanisme impliqué dans ce transport d'ADN nu n'ait pas pu être élucidé à ce jour, il rappelle la compétence naturelle de certaines bactéries, dont des protéobactéries, à réaliser un tel transport. Dans la mesure où les mitochondries sont considérées comme ayant évolué à partir de telles protéobactéries, il est tentant d'imaginer que ce transport représente la persistance d'une voie ancestrale d'origine bactérienne. Confortant cette idée, il a été montré récemment que de l'ADN peut être transféré par conjugaison entre des bactéries *Escherichia coli* et des mitochondries de mammifères [10].

Importer de l'ARN dans les mitochondries

Cette fois, même s'il subsiste de nombreuses incertitudes, les données ne manquent pas quant aux mécanismes qui permettent d'importer de l'ARN dans les mitochondries, puisque ces systèmes existent, en particulier pour les ARN de transfert (ARNt), chez plusieurs protozoaires, plantes et levures [11]. Les mitochondries de mammifères n'importent pas naturellement d'ARNt, mais pourraient importer certains petits ARN, en particulier l'ARN ribosomique (ARNr) 5S [12]. Un mécanisme de transport mitochondrial des ARNt serait néanmoins présent de manière cryptique dans la cellule humaine. Ce système requiert plusieurs protéines cytosoliques permettant de cibler les ARNt vers les mitochondries, étape suivie par une internalisation nécessitant l'intégrité du système d'import des protéines (Figures 2, 3) [13]. Le processus d'import d'un ARNt^{Lys}




Figure 3. Les complexes membranaires permettant l'import et la mise en place des protéines dans les mitochondries. On distinguera les deux membranes mitochondriales, externe (me) et interne (mi). La première porte le système TOM (translocase of the outer membrane) qui reconnaît les séquences d'adressage des protéines destinées à être importées dans la matrice mitochondriale. Les protéines dites β -barrel sont distribuées dans la membrane externe par le système TOB (Topogenesis of mitochondrial outer-membrane β -barrel proteins) (A). A cheval sur les deux membranes grâce à sa sous-unité 23, le complexe TIM (translocase of the inner membrane) assure, sous la dépendance du potentiel de membrane ($\Delta\psi$) et en liaison avec les protéines HSP70 agissant elles grâce à l'hydrolyse de l'ATP, l'import des polypeptides depuis l'espace inter-membranaire (im) jusqu'à l'espace matriciel (B). Spécifiquement impliqué dans la mise en place de protéines du type du transporteur des adénylates, TIM22 (C) apparaît distinct du complexe TIM. Finalement, le complexe OXA1 permet la redistribution à la membrane interne de protéines synthétisées dans la matrice mitochondriale (D). Le système TOM/TIM permet l'import de protéines allotoptiques synthétisées dans le noyau à partir de gènes mitochondriaux recodés pour tenir compte des 5 différences existant entre le code génétique mitochondrial et le code universel (en haut à gauche ; indiqué entre parenthèses). Le même système est impliqué dans l'import d'ARN de transfert cytosolique grâce à une reconnaissance de protéines chaperons liant l'ARNt (en haut à droite).

a été particulièrement bien étudié chez la levure et ses facteurs essentiels ont été identifiés [14]. Il est également possible d'introduire une




Figure 4. Complémentation fonctionnelle de déficits de la chaîne respiratoire par des protéines allotopiques. **A.** La chaîne respiratoire des mammifères permet au cours du transfert des électrons d'établir un gradient électro-chimique à travers la membrane interne des mitochondries. L'ATPase (complexe V) utilise le gradient de protons ainsi établi pour synthétiser l'ATP à partir d'ADP et de phosphate inorganique. **B.** L'expression de la protéine Ndi1 de la levure *Saccharomyces cerevisiae* permet à elle seule de court-circuiter les 46 sous-unités du complexe I de la chaîne respiratoire. **C.** De façon similaire l'expression de l'oxydase alternative (AOX) permet de court-circuiter la partie cytochrome de la chaîne respiratoire. **D.** L'expression simultanée des protéines Ndi1 et AOX permet d'envisager la mise en route d'une voie alternative de transfert d'électrons telle qu'elle existe chez les plantes, totalement indépendante de la synthèse d'ATP.

ou plusieurs mutations dans un ARNt, jusqu'à changer son identité (le faire charger par un autre acide aminé), et garder sa capacité à être importé dans les mitochondries. Ces connaissances ont été exploitées pour mettre au point le premier modèle de complémentation d'une mutation pathogénique dans un ARNt normalement codé par l'ADNmt. Pour cela, deux versions d'ARNt^{Lys} ont été exprimées dans des cellules humaines dont l'ADNmt était muté. Il a été démontré que l'expression des ARNt^{Lys} importables de levure dans les cellules humaines mutées dans le gène d'ARNt^{Lys} mitochondrial (A8344G, cause reconnue du syndrome *myoclonic epilepsy with ragged red fibers* ou *MERRF*²) permettait une récupération partielle des fonctions mitochondriales affectées par la mutation, comme l'activité des complexes respiratoires, le potentiel de membrane, la synthèse des protéines [15]. Ainsi, l'existence de systèmes cryptiques d'import d'ARNt présents chez l'homme permettent l'import d'ARNt provenant de levure et ainsi la complémentation fonctionnelle de déficits liés à des mutations d' mitochondriaux.

Un autre groupe d'organismes protozoaires, les trypanosomatidés, possède un appareil d'import des ARNt différent de celui de la levure. Indépendant de l'appareil d'import des protéines, il est constitué d'un complexe multi-protéique RIC (*RNA import complex*) ancré dans la membrane interne des mitochondries. Il a été démontré que le système d'import RIC pouvait être incorporé dans les mitochondries isolées humaines et promouvoir un import très efficace d'ARNt (Figure 2) [16]. Plus récemment, en se fondant sur ces résultats *in vitro*, il a été montré que l'on pouvait forcer le complexe RIC à entrer dans des cellules humaines par une voie contrôlée par la cavéoline. Une fois dans les cellules, le complexe RIC s'associe aux mitochondries et permet l'import d'ARNt. Ainsi il est possible de compléter fonctionnellement des fibroblastes humains porteurs de mutations dans l'ARNt^{Lys} mitochondrial associées aux syndromes MERFF et KSS (*Keans-Sayre syndrome*, une maladie systémique où s'observent souvent une ophtalmoplégie, une rétinite pigmentaire, une dysphagie, une faiblesse musculaire proximale, une surdité, une ataxie cérébelleuse et des défauts de conduction cardiaque) [17].

² La prévalence de cette pathologie en Europe est de 0,9 cas pour 100 000, elle semble un peu plus élevée aux États-Unis. La maladie débute, le plus souvent à l'adolescence ou chez de jeunes adultes, par une épilepsie myoclonique, parfois associée à une surdité neurosensorielle, une atrophie optique, une petite taille ou une neuropathie périphérique. Le diagnostic du syndrome de MERRF repose sur la mise en évidence d'une accumulation de lactate dans le sang ou, plus souvent, dans le liquide céphalo-rachidien et sur la biopsie musculaire qui montre la présence de fibres déficitaires en cytochrome c oxydase et de fibres rouges déshépatées (D Lombes, Orphanet).

À côté de ces manipulations permettant l'adressage artificiel d'ARNt, les mitochondries humaines, comme noté plus haut, ont la compétence d'importer, de façon naturelle cette fois, l'ARNr 5S [12]. Cet import requiert de l'énergie sous forme d'ATP et la présence de protéines additionnelles, suggérant que, comme celui des ARNt, ce transport s'effectue par le biais du système d'import des protéines. Il serait tentant d'exploiter cette voie pour développer un autre système de complémentation, en adressant dans les organites des ARNr 5S recombinants ayant une activité thérapeutique.

Importer des protéines dans les mitochondries

Deux stratégies ont été développées afin d'importer cette fois des protéines dans les mitochondries en utilisant les systèmes d'import naturellement présents (Figure 3) [18,19]. Dans le but de compléter le dysfonctionnement d'une protéine normalement codée par un gène porté par l'ADN mt, on a tenté - après avoir changé le code du gène pour le rendre compatible avec le système de traduction cytosolique - d'exprimer ce gène dans le noyau des cellules [18]. Lorsqu'elle est pourvue d'une séquence d'adressage mitochondriale, la protéine nucléaire produite peut être reconnue par le système TOM (*translocator of the outer membrane*) puis TIM (*translocator of the inner membrane*) et être importée dans les mitochondries. L'efficacité est néanmoins relativement faible, car les protéines codées par le génome mitochondrial humain sont connues pour leur forte hydrophobicité [19]. La nature hydrophobe de ces protéines s'oppose à un trafic intracellulaire efficace permettant leur distribution aux mitochondries. Pour résoudre ce délicat problème, certains ont proposé l'addition de séquences permettant d'adresser l'ARN messager (ARNm) aux ribosomes associés aux mitochondries ce qui favoriserait la synthèse des protéines à la surface de ces organites [20]. Ainsi, les protéines synthétisées ne transitent plus dans la phase aqueuse cytosolique, mais sont prises en charge par le système TIM/TOM, permettant une complémentation efficace des déficits de la chaîne respiratoire.

Autre approche, l'import de protéines normalement absentes chez l'homme et dont la fonction peut permettre de court-circuiter des segments non fonctionnels de la chaîne respiratoire (CR) (Figure 4). Ainsi, il existe chez les plantes et chez certains micro-organismes, en particulier la levure *S. cerevisiae*, une protéine qui, à elle seule, est susceptible de transférer les électrons du NADH mitochondrial vers le *pool* des quinones [21]. Importée dans la mitochondrie, cette protéine, nommée Ndi1 chez la levure, peut permettre de contourner le complexe I [22]. Ndi1 peut ainsi compléter fonctionnellement des cellules humaines déficitaires en complexe I [23]. Les plantes et certains animaux possèdent aussi une oxydase alternative (AOX), susceptible de transférer les électrons depuis le *pool* de quinones jusqu'à l'oxygène pour former de l'eau [24]. Cette voie permet de court-circuiter tout le segment cytochromique terminal de la CR. Les conditions d'activation de cette voie

sont particulièrement intéressantes puisqu'elles impliquent une forte réduction du *pool* des quinones [25] et la présence d'acides organiques tels que le pyruvate [26] : deux conséquences reconnues des déficits touchant la CR. Il a été démontré récemment que l'AOX pouvait être exprimée sans effets néfastes détectables dans des cellules humaines en culture, cellules dont la respiration devient alors insensible au cyanure (inhibiteur de la cytochrome oxydase) [27] et dont les mitochondries produisent moins de superoxydes en cas de blocage de la CR. Les travaux visent désormais à compléter des cellules déficitaires en cytochrome oxydase par la protéine AOX, alors que plusieurs équipes unissent leurs forces pour créer différents modèles animaux (souris et mouches) porteurs de cette protéine. Finalement, il a été montré dans des cellules en culture que l'import dans les mitochondries d'une enzyme de restriction, en l'occurrence SmaI, coupant spécifiquement l'ADNmt muté dans le gène ATPase 6 (T8993G), permettait de détruire l'ADN muté [28].

En conclusion, il apparaît qu'importer du matériel exogène dans les mitochondries se révèle dès maintenant une stratégie productive et prometteuse pour l'avenir. Dans un premier temps, elle révèle et exploite des propriétés des mitochondries encore largement inconnues. La place de ces dernières dans nombre de pathologies confère à ces informations nouvelles toute leur valeur. Mais outre ces aspects fondamentaux, elle ouvre une voie nouvelle pour mieux comprendre ces pathologies, la complémentation fonctionnelle de tout ou partie des déficits permettant en particulier d'en apprécier mieux les différents composants. Ainsi, si l'expression des protéines Ndi1 et AOX va permettre le rétablissement du flux d'électrons vers l'oxygène, elle ne restituera que partiellement le gradient de protons nécessaire à la synthèse d'ATP (Figure 4).

Bien sûr, il n'est pas question de prétendre ici que ces approches vont déboucher demain sur des thérapies. Les obstacles restent nombreux, en particulier dans le cas de maladies pluri-systémiques comme peuvent l'être parfois les maladies mitochondriales. Pourtant, ces études ouvrent une nouvelle approche vers la thérapie de ces maladies qui nous laissent très démunis. Bien entendu, elles vont rencontrer en outre les problèmes inhérents à toute thérapie génique - ciblage des cellules atteintes, rejet par l'organisme, difficulté de production des vecteurs, contrôle de l'innocuité des manipulations effectuées, etc. - mais elles préparent les outils thérapeutiques de demain pour vaincre les maladies mitochondriales. ♦

SUMMARY

Targeting allotypic material to the mitochondrial compartment: New tools for better understanding mitochondrial physiology and prospect for therapy

Mitochondrial disorders can not be ignored anymore in most medical areas. They include specific and widespread organ involvement, with tissue degeneration or tumor formation, being the target of numerous viruses, e.g. the HIV... Primary or secondary actors, mitochondrial dysfunctions are also supposedly playing a role in the ageing process. Despite the progresses made in the identification of their molecular bases, nearly all remains to be done as regards therapy. Research dealing with mitochondrial physiology and pathology has a long history in France and is thus not a surprise if four French teams, coming from these fundamental domains, are involved in the challenge to find ways to fight these diseases. The directions described are working tracks which promise to be long and full of pitfalls. Being original, they share a part of risk and uncertainty, but they are also with great potential with high stakes if considering the impact of these diseases. ♦

RÉFÉRENCES

- Wallace DC. A mitochondrial paradigm of metabolic and degenerative diseases, aging, and cancer: a dawn for evolutionary medicine. *Annu Rev Genet* 2005 ; 39 : 359-407.
- Mokranjac D, Neupert W. Protein import into mitochondria *Biochem Soc Trans* 2005 ; 33 : 1019-23.
- Nugent JM, Palmer JD. RNA-mediated transfer of the gene *coxII* from the mitochondrion to the nucleus during flowering plant evolution *Cell* 1991 ; 66 : 473-81.
- Ricchetti M, Tekaiia F, Dujon B. Continued colonization of the human genome by mitochondrial DNA *PLoS Biol* 2004 ; 2 : E273.
- Stupar RM, Lilly JW, Town CD, et al. Complex mtDNA constitutes an approximate 620-kb insertion on *Arabidopsis thaliana* chromosome 2: implication of potential sequencing errors caused by large-unit repeats *Proc Natl Acad Sci U S A* 2001 ; 98 : 5099-103
- Knoop V. The mitochondrial DNA of land plants: peculiarities in phylogenetic perspective *Curr Genet* 2004 ; 46 : 123-39.
- Brown GG, Zhang M. Mitochondrial plasmids: DNA and RNA. In: Levings III, C. S., and Vasil, I. K. (eds). *The molecular biology of plant mitochondria*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, the Netherlands.
- Koulintchenko M, Konstantinov Y, Dietrich A. Plant mitochondria actively import DNA via the permeability transition pore complex *Embo J* 2003 ; 22 : 1245-54.
- Koulintchenko M, Temperley R J, Mason PA, et al. Natural competence of mammalian mitochondria allows the molecular investigation of mitochondrial gene expression *Hum Mol Genet* 2006 ; 15 : 143-54.
- Yoon YG, Koob MD. Transformation of isolated mammalian mitochondria by bacterial conjugation *Nucleic Acids Res* 2005 ; 33 : e139.
- Entelis NS, Kolesnikova OA, Martin RP, Tarassov IA. RNA delivery into mitochondria *Adv Drug Deliv Rev* 2001 ; 49 : 199-215.
- Entelis NS, Kolesnikova OA, Doga S, et al. 5 S rRNA and tRNA import into human mitochondria. Comparison of in vitro requirements *J Biol Chem* 2001 ; 276 : 45642-45653.
- Kolesnikova OA, Entelis NS, Mireau H, et al. Suppression of mutations in mitochondrial DNA by tRNAs imported from the cytoplasm *Science* 2000 ; 289 : 1931-3.
- Entelis N, Brandina I, Kamenski P, et al. A glycolytic enzyme, enolase, is recruited as a cofactor of tRNA targeting toward mitochondria in *Saccharomyces cerevisiae* *Genes Dev* 2006 ; 20 : 1609-20.
- Kolesnikova OA, Entelis NS, Jacquin-Becker C, et al. (2004) Nuclear DNA-encoded tRNAs targeted into mitochondria can rescue a mitochondrial DNA mutation associated with the MERRF syndrome in cultured human cells *Hum Mol Genet* 2004 ; 13 : 2519-34.
- Mahata B, Bhattacharyya SN, Mukherjee S, Adhya S. Correction of translational defects in patient-derived mutant mitochondria by complex-mediated import of a cytoplasmic tRNA *J Biol Chem* 2005 ; 280 : 5141-4.
- Mahata B, Mukherjee S, Mishra S, et al. Functional delivery of a cytosolic tRNA into mutant mitochondria of human cells *Science* 2006 ; 314 : 471-4.
- Manfredi G, Fu J, Ojaimi J, et al. (2002) Rescue of a deficiency in ATP synthesis by transfer of MTATP6, a mitochondrial DNA-encoded gene, to the nucleus *Nat Genet* 2002 ; 30 : 394-99.
- Bokori-Brown M, Holt IJ. Expression of algal nuclear ATP synthase subunit 6 in human cells results in protein targeting to mitochondria but no assembly into ATP synthase *Rejuvenation Res* 2006 ; 9 : 455-69.
- Kaltimbacher V, Bonnet C, Lecoeuvre G, et al. mRNA localization to the mitochondrial surface allows the efficient translocation inside the organelle of a nuclear recoded ATP6 protein *Rna* 2006 ; 12 : 1408-17.
- Bénit P, Lebon S, Chol M, et al. Mitochondrial NADH Oxidation Deficiency in Humans *Current Genomics* 2004 ; 5 : 137-46.
- Yagi T, Seo BB, Nakamaru-Ogiso E, et al. Can a single subunit yeast NADH dehydrogenase (Ndi1) remedy diseases caused by respiratory complex I defects? *Rejuvenation Res* 2006 ; 9 : 191-7.
- Bai Y, Hu P, Park JS, et al. Genetic and functional analysis of mitochondrial DNA-encoded complex I genes *Ann N Y Acad Sci* 2004 ; 1011 : 272-83.
- McDonald A, Vanlerberghe G. Branched mitochondrial electron transport in the Animalia: presence of alternative oxidase in several animal phyla *IUBMB Life* 2004 ; 56 : 333-41.
- Affourtit C, Krab K, Moore AL. Control of plant mitochondrial respiration *Biochim Biophys Acta* 2001 ; 1504 : 58-69.
- Umbach AL, Ng VS, Siedow JN. Regulation of plant alternative oxidase activity: a tale of two cysteines *Biochim Biophys Acta* 2006 ; 1757 : 135-42
- Hakkaart GA, Dassa EP, Jacobs HT, Rustin P. Allotopic expression of a mitochondrial alternative oxidase confers cyanide resistance to human cell respiration *EMBO Rep* 2005 ; 7 : 341-5.
- Tanaka M, Borgeldt HJ, Zhang J, et al. Gene therapy for mitochondrial disease by delivering restriction endonuclease SmaI into mitochondria *J Biomed Sci* 2002 ; 9 : 534-41.

TIRÉS À PART

P. Rustin